



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشت

نام واکسن : کوواکسین

کشور سازنده : هندوستان

نوع واکسن : ds DNA ویروس غیر فعال

تعداد دوز (تزریق) : ۲ نوبت

فاصله بین دو نوبت : ۲۸ روز

کاربرد گروه سنی : ۱۸ سال و بالاتر

اثر بخشی واکسن : ۸۱٪



افرادی که نباید واکسن تزریق کنند :

- ◀ حساسیت به هر یک از اجزای واکسن
- ◀ خانم های باردار و دوران شیردهی
- ◀ بیماریهای حاد و یا تب دار (مانند کووید ۱۹)
- ◀ اشخاص زیر ۱۸ سال

افرادی که باید با احتیاط و با مشورت پزشک واکسن بزنند:

- افرادی که مبتلا به بیماری خونریزی دهنده یا اختلال انعقادی (هموفیلی) هستند یا داروهای رقیق کننده خون (ضدانعقادی) مصرف می کنند، واکسیناسیون باید در ساعت های اول بعد از دریافت فاکتورهای انعقادی انجام شود و محل تزریق حدود ۳۰

دقیقه تحت فشار قرار داده شود.

- افرادی که ضعف سیستم ایمنی یا بیماری اتوایمیون دارند باید با پزشک معالج خود مشورت نمایند .

عوارض واکسن :

عوارض شایع : شایع ترین عارضه موضعی درد در محل تزریق و

شایعترین عارضه سیستمیک سردرد بوده است و سپس ضعف، تب، درد و کوفتگی بدن، درد شکم ، تهوع و استفراغ بوده است.

عوارض کمتر شایع: احساس گیجی، لرزش، تعریق، احساس سرما،

سرفه و تورم محل تزریق بوده است.

اقدامات لازم بعد از تزریق واکسن :

- بعد از دریافت واکسن تا ۳۰ دقیقه در مرکز بمانید.

- در صورت بروز علائم خفیف مانند درد، تب و آبریزش بینی از مسکن مانند استامینوفن یا آنتی هیستامین استفاده کنید و در صورت بروز عوارض **شدید** با مرکزی که واکسن تزریق شده تماس بگیرید.

سفیران سلامت تهران در فضای مجازی

@safiranesalamattehran